

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医師	印
C c r	ml/min		

V A C
(登録No. 10C002)

病名	推奨度
横紋筋肉腫	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/
V C R (1.5mg/m ²)	↓						
A C T - D (1.5mg/m ²)	↓						
C P A (2200mg/m ²)	↓						
V C R (1.5mg/m ²)					↓	↓	
	Day	1	2	3	4	8	15
		(1サイクル 21 日)			(休薬 6 日以上)		

1 ソルデム 3 A 輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 MAIN①	(1) (2) (3)
2 ソルデム 3 A 輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 MAIN②	(1) (2) (3)
3 ソルデム 3 A 輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 MAIN③	(1) (2) (3)
4 ソルデム 3 A 輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 MAIN④	(1) (2) (3)
5 ソルデム 3 A 輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 MAIN⑤	(1) (2) (3)
6 ソルデム 3 A 輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 MAIN⑥	(1) (2) (3)
7 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(1)
8 生理食塩液 50 mL オンコビン注射用 1 mg () mg (1.5mg/m ²)	50 mL	点滴注射 全開 側管 V C R : M A X 2 m g	(1)
9 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

コスメゲン静注用0.5mg 注射用水 20ml	() mg (1.5mg/m ²) 20 mL	全開 側管	(1)
10 生理食塩液テルモ 250mL エンドキサン注射用	250 mL () mg (2200mg/m ²)	点滴注射 120分 側管	(1)
11 生理食塩液 50mL ウロミテキサン注400mg	50 mL 1200 mg	点滴注射 30分 側管 エンドキサンと同時滴下	(1)
12 ポタコールR輸液 500mL	500 mL	点滴注射 120分 側管	(1)
13 生理食塩液 50mL ウロミテキサン注400mg	50 mL 1200 mg	点滴注射 30分 側管 エンドキサン投与4hr後	(1)
14 ポタコールR輸液 500mL	500 mL	点滴注射 210分 側管	(1)
15 生理食塩液 50mL ウロミテキサン注400mg	50 mL 1200 mg	点滴注射 30分 側管 エンドキサン投与8hr後	(1)
16 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 全開	(8)(15)
17 生理食塩液 50mL オンコビン注射用1mg	50 mL () mg (1.5mg/m ²)	点滴注射 全開	(8)(15)
18 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(8)(15)
19 アプレピタントカプセル125mg「N」	1 c p	内服 点滴開始前に内服 day1	
20 アプレピタントカプセル80mg「NK」	1 c p	内服 朝食後 day2、3	
21 デカドロン錠4mg	8 mg	内服 2錠 分2 朝昼食後 day2-4	

