

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

FLAGM

(登録No. 12HT14)

病名

推奨度

急性骨髄性白血病

B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

		予定日付					
		1	2	3	4	5	6
F-ara-A	(15mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	
M I T	(10mg/m ²)				↓	↓	↓
A r a C	(2000mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	
F-ara-A	(15mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	
A r a C	(2000mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	
Day		1	2	3	4	5	6
		(1サイクル 35 日)			(休薬 29 日以上)		

★要時発注：パントロン

1 グランシリンジM300	1 筒	皮下注射	10：00～	(1) (2) (3) (4)
2 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射	10：00～翌10：00	(2) (3) (4) (5) (6)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射	ルートキープ	(2) (3) (4) (5) (6)
4 生理食塩液 100mL フルダラ静注用50mg 注射用水 20mL	100 mL () mg (15mg/m ²) 20 mL	点滴注射	30分 10：00～10：30 フルダラ1Vを注射用水2.5mLで溶解	(2) (3) (4) (5)
5 生理食塩液 100mL ノバントロン注10mg	100 mL () mg (10mg/m ²)	点滴注射	30分 10：30～11：00	(4) (5) (6)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射	フラッシュ用	(2) (3) (4) (5) (6)
7 パロセトロン点滴静注パッケ0.75mg/50	50 mL	点滴注射	15分 13：45～14：00	(2)

8	生理食塩液 50 mL ソル・コーテフ注射用 100 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 全開 14 : 00	(2) (3) (4) (5)
9	生理食塩液テルモ 500 mL キロサイド注 () mg (2000mg/m ²)	500 mL	点滴注射 180分 14 : 00～17 : 00 total 500mLとなるように調製	(2) (3) (4) (5)
10	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(2) (3) (4) (5)
11	生理食塩液 100 mL フルダラ注 50 mg () mg (15mg/m ²) 注射用水 20 mL	100 mL 20 mL	点滴注射 30分 22 : 00～22 : 30 フルダラ1Vを注射用水2.5mLで溶解	(2) (3) (4) (5)
12	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(2) (3) (4) (5)
13	生理食塩液 50 mL ソル・コーテフ注射用 100 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 全開 翌2 : 00	(2) (3) (4) (5)
14	生理食塩液テルモ 500 mL キロサイド注 () mg (2000mg/m ²)	500 mL	点滴注射 180分 翌2 : 00～5 : 00 total 500mLとなるように調製	(2) (3) (4) (5)
15	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(2) (3) (4) (5)
16	ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注8.4% 20 mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 側管	(2) (3) (4) (5) (6)
17	ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注8.4% 20 mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 側管	(2) (3) (4) (5) (6)
18	ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注8.4% 20 mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 側管	(2) (3) (4) (5) (6)