

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ニボルマブ + mFOLFOX6 (インフルザ-使用)

(登録No. 21GI05)

病名

推奨度

胃癌
食道癌B
C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
Nivolumab	(240mg)	↓
1-LV	(200mg/m ²)	↓
1-OHP	(85mg/m ²)	↓
5-FU	(400mg/m ²)	↓
5-FU	(2400mg/m ²)	↓
	Day	1
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL オプジーボ点滴静注 (240) mg	100 mL 240) mg	点滴注射 30分 0.2または0.22μmの インラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトン点滴静注パッケ0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
5 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL () mg (200mg/m ²)	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	(1)
6 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)	250 mL () mg (85mg/m ²)	点滴注射 120分 レボホリナートと同時滴下	(1)
7 フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²) 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, L-OHP同時滴下終了後	

8 生理食塩液 50 mL

50 mL

点滴注射
フラッシュ用

(1)

9 フルオロウラシル注
生理食塩液 50 mL

() mg (2400mg/m²)
50 mL

中心静脈注射・精密持続
インフューザー使用 46時間
生食希釈量早見表参照

(1)

(1)