

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

アテゾリズマブ + CBDCA/Pem

(登録No. 21LU01)

病名

推奨度

非小細胞肺癌

C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/
atezolizumab	(1200mg)	↓		
Pem	(500mg/m ²)	↓		
CBDCA	(5×(G+25))	↓		
	Day	1	2	3
		(1サイクル 21 日) (休薬 18 日以上)		

非扁平上皮癌 4-6コース

1 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用 全開	(1)
2 大塚生食注 (250mL袋) テセントリク点滴静注1200mg (1200) mg	250 mL	点滴注射 60分 0.2μm又は0.22μmのインラインフィルター を使用 初回投与忍容性良好であれば 2回目以降30分投与可	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトン点滴静注パック 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液 100mL ペムセト点滴静注液「NK」 () mg (500mg/m ²)	100 mL	点滴注射 10分	(1)
6 ブドウ糖液 5% (250mL) カルボプラチン注射液 () mg (5×(G+25))	250 mL	点滴注射 60分 CBDCA : AUC 5-6	(1)
7 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)

8 アプレピタントカプセル125mg 「N 1 c p 内服
day1 点滴開始時

9 アプレピタントカプセル80mg 「NK 1 c p 内服
day2, 3 朝食後

パンピタン末 1g 内服 分1 朝食後 7日前より連日内服

メチコバル注射液 5 0 0 μ g 2A 筋肉内注射 7日前より9週毎投与

* Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日
予防投与を行う