

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

【減量】アザシチジン静注 (33%dose)

(登録No. 23HT06)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病 名	推奨度
骨髄異形成症候群	A
急性骨髄性白血病	B

A Z A	予定日付	/	/	/	/	/	/	/
	(24.75mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5	6	7

(1サイクル 28 日) (休薬 21 日以上)

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10時～翌10時	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開 側管	(1) (5)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(2) (3) (4) (6) (7)
4 生理食塩液 100mL アザシチジン注射用100mg「サワ」 注射用水 20mL	100 mL () mg (24.75mg/m ²) 10 mL	点滴注射 10分 側管 注射用水 10mL/Vで溶解 滴下にはポンプを使用	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6 ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 側管 補液追加あり	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)