

化学療法スケジュール表

一般治療
 臨床試験
 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S cr	mg/dL		
C cr	ml/min		

NAC デュルバルマブ+ CBDCA/Pem
(登録No. 25LU18)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

Durvalmab	(1500m g)	予定日付 ↓	/
Pem	(500m g / m ²)	↓	
CBDCA	(5 × (G+25))	↓	
Day	1		
		(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)	

非扁平上皮癌 最大4コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2 生理食塩液 100 mL イミフィンジ点滴静注	100 mL (1500) m g	点滴注射 60分 ※BW≤30kgの場合は、20mg/kg 0.2または0.22 μmのインラインフィルター使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液 100 mL ペメタセド点滴静注液「NK」	100 mL () m g (500m g / m ²)	点滴注射 10分	(1)
6 ブドウ糖液 5% (250 mL) カルボプラチニ点滴静注液	250 mL () m g (5 × (G+25))	点滴注射 60分	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
8 アプレビタントカプセル125mg 「N	1' c p	内服 day1 点滴開始時	

9 アプレピタントカプセル80mg 「NK

1 c p

内服

day2,3 朝食後

パンビタン末 1g 内服 分1 朝食後 7日前より連日内服

メチコバール注射液 500 μ g 2A 筋肉内注射 7日前より9週毎投与

*Pemによる皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン8mg/日
予防投与を行う