

化学療法スケジュール表

- ☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

twHer (2回目以降) + ツカニブ + カペシタビン
(登録No. 26BR12)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
乳癌	B

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Trastuzumab	(6m g/kg)	↓									
Tucatinib	(600m g)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Cape	(2000m g/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tucatinib	(600m g)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Cape	(2000m g/m ²)	↓	↓	↓	↓						
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/									
Tucatinib	(600m g)	↓									
	Day	21									
(1サイクル 21 日) (休薬 日以上)											

ツカイザ錠 (CYP3Aを強阻害) : 併用禁忌あり、院外専用薬

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 大塚生食注 (250mL袋) トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20 mL	250 mL () m g (6m g/kg) 20 mL	点滴注射 30分 60mg: 注射用水3.0m Lで溶解 150mg: 注射用水7.2mLで溶解	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 ツカイザ錠150mg	(600) m g	内服 分2 朝夕食後 連日服用	
5 カペシタビン錠300mg 「カカ」	() m g (2000m g/m ²)	内服 分2 朝夕食後 カペシタビンの投与量は以下の通り 体表面積1.36未満→1200mg/回 1.36～1.66m ² 未満→1500mg/回	

1.66～1.96㎡未満→1800mg/回

1.96㎡以上→2100mg/回