

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

Cmab+mFOLF0X6+エンコラフェニブ[®] (インフューザ[®]-使用)
 (登録No. 26GI03)

病名	推奨度
大腸癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cmab	(500m g / m ²)		↓									
1-L V	(200m g / m ²)		↓									
1-O H P	(85m g / m ²)		↓									
5-F U	(400m g / m ²)		↓									
5-F U	(2400m g / m ²)		↓									
Encorafenib	(300m g)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		予定日付	/	/	/	/						
Encorafenib	(300m g)		↓	↓	↓	↓						
		Day	11	12	13	14						
			(1サイクル 14 日) (休薬 日以上)									

EGFR陽性KRAS野生型、BRAFV600変異型

1 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液 6. 6 mg	1 瓶	15分	
ポララミン注 5 mg	1 A		(1)
2 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
アービタックス注射液 100 mg () mg (500mg/m ²)		120分	
		Total 250mLに調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	
		アービタックス投与時と同じ速度でフラッシュ	(1)
4 パロセトン点滴静注パック 0.75mg/50	50 mL	点滴注射	
		15分	(1)
5 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)		120分	
		オキサリプラチンと同時滴下	
		側管	(1)
6 ブドウ糖液 5% (250 mL)	250 mL	点滴注射	

オキサリプラチン点滴静注液		() m g (85m g / m ²)	120分 レボ ホナトと同時滴下	(1)
7 生理食塩液 50 m L	フルオロウラシル注	50 m L () m g (400m g / m ²)	点滴注射 1-LV, L-OHP同時滴下終了後 全開	(1)
8 生理食塩液 50 m L		50 m L	点滴注射 フラッシュ用	(1)
9 フルオロウラシル注 生理食塩液 50 m L		() m g (2400m g / m ²) 50 m L	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 4 6 時間 生食希釈量早見表参照	(1)
10 ビラフトビカプセル75mg		(300) m g	内服 1日1回 day1-14	