

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

Cmab+mFOLF0X6+エンコラフェニブ[®] (入院)

(登録No. 26GI04)

病名	推奨度
大腸癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cmab	(500mg/m ²)	↓											
1-LV	(200mg/m ²)	↓											
1-OHP	(85mg/m ²)	↓											
5-FU	(400mg/m ²)	↓											
5-FU	(1200mg/m ²)	↓	↓										
Encorafenib	(300mg)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		予定日付	/	/	/	/							
Encorafenib	(300mg)	↓	↓	↓	↓								
Day		11	12	13	14								
		(1サイクル 14 日)				(休薬 日以上)							

EGFR陽性KRAS野生型、BRAFV600変異型 ヒラティビ[®] 75 : 院外専用薬剤

1 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液 6.6 mg	1 瓶	15分	
ポララミン注 5 mg	1 A	5FU急速静注後のフラッシュまで	
		パルピット針セット 二股タイプ 使用	(1)
2 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
アービタックス注射液 100 mg () mg (500mg/m ²)		120分	
		Total 250mL	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	
		アービタックス投与時と同じ速度でフラッシュ	(1)
4 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50	50 mL	点滴注射	
		15分	(1)
5 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)		120分	
		オキサリプラチンと同時滴下	
		側管	(1)

6	ブドウ糖液 5 % (2 5 0 mL) オキサリプラチン点滴静注液	(250) mL () m g (85 m g / m ²)	点滴注射 120分 レボ カリナートと同時滴下	(1)
7	生理食塩液 5 0 mL フルオロウラシル注	(50) mL () m g (400 m g / m ²)	点滴注射 1-LV, L-OHP同時滴下終了後 全開	(1)
8	生理食塩液 5 0 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
9	生理食塩液 5 0 mL	50 mL	点滴注射 フルオロウラシルルートプライミング用	(1)
10	生理食塩液テルモ 5 0 0 mL フルオロウラシル注	(500) mL () m g (1200 m g / m ²)	点滴注射 23時間	(1) (2)
11	生理食塩液 5 0 mL	50 mL	点滴注射 フルオロウラシルフラッシュ用	(2)
12	ビラフトビカプセル75mg	(300) m g	内服 1日1回 day1-14	