

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

Bela-Pd (Bela 2段階減量)

(登録No. 26HT12)

病名

多発性骨髄腫

推奨度

B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Belantamab	(1.4/kg)		↓									
Pomalidomide	(4m g)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
D E X	(40m g)		↓					↓				
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide	(4m g)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
D E X	(40m g)						↓					
		Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide	(4m g)		↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
D E X	(40m g)			↓	↓							↓
		Day	21	22	29	30	31	32	33	34	35	36
		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide	(4m g)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
D E X	(40m g)								↓			
		Day	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide	(4m g)		↓	↓	↓							
D E X	(40m g)					↓						
		Day	47	48	49	50						
(1サイクル 56 日) (休薬 6 日以上)												

76歳以上や全身状態不良例はDEX1回20mgへ減量 ★要時発注：ブーレンレップ、ホーマリス(1mg、3mg)

1 生理食塩液	50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2 生理食塩液	100 mL	100 mL	点滴注射	
ブーレンレップ	()	(1.4/kg)	30分	
注射用水	20 mL	20 mL	濃度0.2~2mg/mLに調製	(1)
3 生理食塩液	50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)

4 ポマリストカプセル4mg	(4) m g	内服 day1-21 day29-49
5 レナデックス錠4 m g	(40) m g	内服 day1, 8, 15, 22 day29, 36, 43, 50