

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

T a f a - R 2 (1コース目)
(登録No. 26HT17)

病名	推奨度
濾胞性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Tafasitamab (12mg/kg)		↓						↓			
Rit-B S (375mg/m ²)		↓						↓			
LEN (20mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tafasitamab (12mg/kg)						↓					
Rit-B S (375mg/m ²)						↓					
LEN (20mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/	/								
Tafasitamab (12mg/kg)			↓								
Rit-B S (375mg/m ²)			↓								
LEN (20mg)		↓									
Day		21	22								

(1サイクル 28日) (休薬 6日以上)

総コース数：12コース リツキシマブは5コースまで、ケイトミドは12コースまで

1	生理食塩液 50 mL ポララミン注 5 mg	50 mL 1 A	点滴注射 全開	(1) (8) (15) (22)
2	生理食塩液 50 mL プレドニン (水溶性) 20 mg	50 mL 100 mg	点滴注射 30分	(1) (8) (15) (22)
3	生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射 30分	(1) (8) (15) (22)
4	大塚生食注 (250mL袋) ミンジュビ点滴静注用200mg 注射用水 20 mL	250 mL () mg (12mg/kg) 20 mL	点滴注射 150分 初回投与開始～30分：70mL/hr その後速度を上げる 投与速度125mL/hrを超えないこと ※2回目以降は2時間で投与 40mg/mLに溶解し希釈、 最終濃度2～8mg/mLに調製	

5	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 15分	(1) (8) (15) (22)
6	生理食塩液テルモ 500 mL リツキシマブBS点滴静注 () mg (375mg/m ²)	500 mL	点滴注射 180分 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分以降 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr シンジエト [®] 投与終了15分以降に開始	(1) (8) (15) (22)
7	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (8) (15) (22)
8	アセトアミノフェン錠500mg 「マ	2 錠	内服 シンジエト [®] 投与60分前 day1, 8, 15, 22	
9	レナリトミド [®] カプセル5mg 「BMSH」 () mg	20 mg	内服 day1-21	