

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**T a f a - R 2 (2-3コース目)**  
(登録No. 26HT18)

病名	推奨度
濾胞性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日  
(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tafasitamab (12m g/kg)	↓							↓		
Rit-B S (375m g/m <sup>2</sup> )	↓									
LEN (20m g)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tafasitamab (12m g/kg)					↓					
LEN (20m g)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/	/							
Tafasitamab (12m g/kg)			↓							
LEN (20m g)	↓									
Day	21	22								

(1サイクル 28 日) (休薬 6 日以上)

総コース数：12コース リツキシマブは5コースまで、レリトミドは12コースまで

1 生理食塩液 50 mL ボララミン注 5 m g	50 mL 1 A	点滴注射 全開	(1) (8) (15) (22)
2 生理食塩液 50 mL プレドニン (水溶性) 20 m g	50 mL 100 m g	点滴注射 30分	(1) (8) (15) (22)
3 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射 30分	(1) (8) (15) (22)
4 大塚生食注 (250mL袋) ミンジュビ点滴静注用200mg ( ) m g (12m g/kg) 注射用水 20 mL	250 mL 20 mL	点滴注射 120分 投与速度125mL/hrを超えないこと 40mg/mLに溶解し希釈、 最終濃度2~8mg/mLに調製 ★42kg未満は生食100mLに変更	(1) (8) (15) (22)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 15分	(1)

6 生理食塩液テルモ 500 mL リツキシマブBS点滴静注	500 mL ( ) mg (375mg/ml)	点滴注射 180分 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分以降 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr シジエト投与終了15分以降に開始	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (8) (15) (22)
8 アセトアミノフェン錠500mg 「マ	2 錠	内服 シジエト投与60分前 day1, 8, 15, 22	
9 レナリトミドカプセル5mg 「BMSH」	( 20) mg	内服 day1-21	