

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

T a f a - R 2 (4-5コース目)
(登録No. 26HT19)

病名	推奨度
濾胞性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tafasitamab (12m g/kg)	↓									
Rit-B S (375m g/m ²)	↓									
LEN (20m g)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tafasitamab (12m g/kg)					↓					
LEN (20m g)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/								
LEN (20m g)	↓									
Day	21									

(1サイクル 34 日) (休薬 13 日以上)

総コース数：12コース リツキシマブは5コースまで、レリトミドは12コースまで

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
ポララミン注 5 m g	1 A	全開	(1) (15)
2 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
プレドニン (水溶性) 20 m g	100 m g	30分	(1) (15)
3 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
		30分	(1) (15)
4 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
ミンジュビ点滴静注用200mg () m g (12m g/kg)		120分	
注射用水 20 mL	20 mL	投与速度125mL/hrを超えないこと	
		40mg/mLに溶解し希釈、	
		最終濃度2~8mg/mLに調製	
		★42kg未満は生食100mLに変更	(1) (15)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		15分	(1)
6 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射	

リツキシマブBS点滴静注	() m g (375m g/ml)	180分 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分以降 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr シジューブ投与終了15分以降に開始	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)(15)
8 アセトアミノフェン錠500mg 「マ	2 錠	内服 シジューブ投与60分前 day1, 15	
9 レナリドミドカプセル5mg 「BMSH」	(20) m g	内服 day1-21	