

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

T a f a - R 2 (6-12コース)
(登録No. 26HT20)

病名	推奨度
濾胞性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Tafasitamab (12mg/kg)	↓										
LEN (20mg)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tafasitamab (12mg/kg)	↓					↓					
LEN (20mg)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/									
LEN (20mg)	↓										
	Day	21									

(1サイクル 34 日) (休薬 13 日以上)

総コース数：12コース リツキシマブは5コースまで、レリトミドは12コースまで

1 生理食塩液 50 mL ポララミン注 5 mg	50 mL 1 A	点滴注射 全開	(1) (15)
2 生理食塩液 50 mL プレドニン (水溶性) 20 mg	50 mL 100 mg	点滴注射 30分	(1) (15)
3 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射 30分	(1) (15)
4 大塚生食注 (250mL袋) ミンジュビ点滴静注用200mg 注射用水 20 mL	250 mL () mg (12mg/kg) 20 mL	点滴注射 120分 投与速度125mL/hrを超えないこと 40mg/mLに溶解し希釈、 最終濃度2~8mg/mLに調製 ★42kg未満は生食100mLに変更	(1) (15)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (15)
6 アセトアミノフェン錠500mg 「マ	2 錠	内服	

インジェビ[®]投与60分前
day1, 15

7 レナリトミド[®]カプセル5mg「BMSH」 (20) m g

内服
day1-21