

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

Ven+AZA (皮下注)
(登録No. 26HT21)

病名	推奨度
急性骨髄性白血病	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AZA (75mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓				
ベネクレスタ100 (100mg)		↓									
ベネクレスタ100 (200mg)			↓								
ベネクレスタ100 (400mg)				↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ベネクレスタ100 (400mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/		
ベネクレスタ100 (400mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
Day		21	22	23	24	25	26	27	28		
(1サイクル 28 日) (休薬 日以上)											

制吐剤内服追加

1	アザシチジン注射用100mg「サワ」 注射用水 20ml	() mg (75mg/m ²) 4 mL	皮下注射
2	ベネクレスタ錠100mg	(100) mg	内服 day1 ★CYP阻害薬併用時のVen用量 ●中等度のCYP3A4阻害剤 (フルコナゾールなど) 用量漸増時、維持投与期 ともに 半量以下に減量 ●強いCYP3A4阻害剤 (イトラコナゾールなど) 用量漸増時 : 1日目は10mg、 2日目は20mg、3日目は50mgに減量 維持投与期 : 50mgに減量
3	ベネクレスタ錠100mg	(200) mg	内服 day2

4 ベネクレクタ錠100mg

(400) m g

内服
day3-