

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

T a f a + L E N (4-12コース目)

(登録No. 26HT24)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
濾胞性リンパ腫	C
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	C

		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
P S L	(100mg)	↓									
Tafasitamab	(12mg/kg)	↓									
L E N	(25mg)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
P S L	(100mg)					↓					
Tafasitamab	(12mg/kg)					↓					
L E N	(25mg)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/									
L E N	(25mg)	↓									
	Day	21									
(1サイクル 28 日) (休薬 7 日以上)											

DLBCL、FL(Grade3B)併用時最大12サイクルまで ミンジュビ要時発注

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
ボララミン注 5 mg	1 A	全開	(1) (15)
2 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
プレドニン (水溶性) 20 mg (100) mg		30分	(1) (15)
3 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
		30分	(1) (15)
4 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
ミンジュビ点滴静注用200mg () mg (12mg/kg)		60分	
注射用水 20 mL	20 mL	※1時間目安で投与	
		投与速度125mL/hrを超えないこと	
		40mg/mLに溶解し希釈、	
		最終濃度2~8mg/mLに調製	
		83kg以上は生食250mLに希釈	(1) (15)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	

- | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|
| 6 アセトアミノフェン錠500mg 「マ | 2 錠 | 内服
シジミト投与60分前
day1, 15 |
| 7 レナリトミトカプセル5mg 「BMSH」 | (25) m g | 内服
day1-21 |