

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

セミプリマブ+CBDCA/Pem

(登録No. 26LU07)

病名

推奨度

非小細胞肺癌

B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 コース目・変更)

	予定日付	/
Cemiplimab	(350mg)	↓
Pem	(500mg/m ²)	↓
CBDCA	(5×(G+25))	↓
	Day	1
	(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)	

最大4コース 扁平上皮癌を除く リア：要時発注

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL リブタヨ点滴静注350mg	100 mL (350) mg	点滴注射 30分 0.2～5μmのインラインフィルター使用 希釈後の最終濃度1～20mg/ml となるように調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液 100 mL ペトリセト点滴静注液「NK」	100 mL () mg (500mg/m ²)	点滴注射 10分	(1)
6 ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン注射液	250 mL () mg (5×(G+25))	点滴注射 60分	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
8 アプレピタントカプセル125mg 「N」	1 c p	内服 day1 点滴開始時	

9 アプレピタントカプセル80mg 「NK

1 c p

内服

day2,3 朝食後

パンビタン末

1g

内服 分1 朝食後 7日前より連日内服

メチコバル注射液500 μ g

2A

筋肉内注射 7日前より9週毎投与

*Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日
予防投与を行う