

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

セミプリマブ+P e m維持

(登録No. 26LU08)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病 名	推奨度
非小細胞肺癌	B

	予定日付	／
Cemiplimab	(350mg)	↓
P e m	(500mg/m ²)	↓
	Day	1
	(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)	

扁平上皮癌を除く リブ注：要時発注

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	ルートキープ用 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射		
リブタヨ点滴静注350mg	(350) mg	30分	0.2～5μmのインラインフィルター使用 希釈後の最終濃度1～20mg/ml となるように調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射		
デキササート注射液6.6mg	1 瓶	15分		(1)
5 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射		
ペムリマブ点滴静注「NK」	() mg (500mg/m ²)	10分		(1)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	フラッシュ用	(1)
パンビタン末	1g	内服 分1	朝食後 7日前より連日内服	
メチコパール注射液500μg	2A	筋肉内注射	7日前より9週毎投与	

*Pemによる皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン8mg/日

予防投与を行う