

化学療法スケジュール表

- ☐ 一般治療
- ☐ 臨床試験
- ☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

リブプロファズ 皮下注 + CBDCA/Pem (C1 BW≥80kg)
(登録No. 26LU09)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
Pem	(500mg/m ²)	↓				
CBDCA	(5×(G+25))	↓				
Amivantamab	(2240mg)	↓				
Amivantamab	(3360mg)				↓	↓
	Day	1	2	3	8	15
		(1サイクル 21日)		(休薬 6日以上)		

Exson20挿入変異陽性・EGFR遺伝子変異陽性 1コース目用 ★要時発注：リブプロファズ

1	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50 デキサート注射液1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100mL ペトリキト点滴静注液「NK」 () mg (500mg/m ²)	100 mL () mg (500mg/m ²)	点滴注射 10分	(1)
3	ブドウ糖液5% (250mL) カルボプラチン注射液 () mg (5×(G+25))	250 mL () mg (5×(G+25))	点滴注射 60分	(1)
4	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5	リブプロファズ配合皮下注 (2240) mg		皮下注射 腹部に5分かけて投与	(1)
6	リブプロファズ配合皮下注 (3360) mg		皮下注射 腹部に5分かけて投与 腹部の異なる場所に連続して投与 30mLのシリンジに均等に分割	(8) (15)
7	アプレピタントカプセル125mg「N」	1 c p	内服 点滴開始時 day1	
8	アプレピタントカプセル80mg「NK」	1 c p	内服	

朝食後 day2、3

9 デカドロン錠4mg	8 m g	内服
デカドロン錠0.5 m g	2 m g	リブロファス [®] 投与60分前 day1、8
10 ルパフィン錠10mg	1 錠	内服
アセトアミノフェン錠500mg 「マ	2 錠	リブロファス [®] 投与30～60分前 day1、8、15

パンビタン末	1g	内服 分1	朝食後 7日前より連日内服
メチコパール注射液500μg	2A	筋肉内注射	7日前より9週毎投与

*Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日
予防投与を行う

以下のいずれかに該当する、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者

- ・化学療法歴のないEGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性
- ・EGFR遺伝子変異(エクソン20挿入変異を除く)陽性
(EGFRチロシンキナーゼ阻害剤による治療後に増悪した患者)