

化学療法スケジュール表

- ☐ 一般治療
- ☐ 臨床試験
- ☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

リゾプラズ 皮下注+CBDCA/Pem (C1 BW<80kg)

(登録No. 26LU10)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
Pem	(500mg/m ²)	↓				
CBDCA	(5×(G+25))	↓				
Amivantamab	(1600mg)	↓				
Amivantamab	(2400mg)				↓	↓
	Day	1	2	3	8	15
		(1サイクル 21 日)			(休薬 6 日以上)	

Exson20挿入変異陽性・EGFR遺伝子変異陽性 1コース目用 ★要時発注：リゾプラズ

1	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50 デキサート注射液1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100 mL ペメトレキド点滴静注液「NK」 () mg (500mg/m ²)	100 mL () mg (500mg/m ²)	点滴注射 10分	(1)
3	ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン注射液 () mg (5×(G+25))	250 mL () mg (5×(G+25))	点滴注射 60分	(1)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5	リブロファズ配合皮下注 (1600) mg		皮下注射 腹部に5分かけて投与	(1)
6	リブロファズ配合皮下注 (2400) mg		皮下注射 腹部に5分かけて投与	(8) (15)
7	アプレピタントカプセル125mg「N」	1 c p	内服 点滴開始時 day1	
8	アプレピタントカプセル80mg「NK」	1 c p	内服 朝食後 day2、3	

9	デカドロン錠4mg	8 m g	内服
	デカドロン錠0.5mg	2 m g	リブプロファス投与60分前 day1、8
10	ルパフィン錠10mg	1 錠	内服
	アセトアミノフェン錠500mg「マ	2 錠	リブプロファス投与30～60分前 day1、8、15

パンピタン末 1g 内服 分1 朝食後 7日前より連日内服
 メチコパール注射液500μg 2A 筋肉内注射 7日前より9週毎投与

*Pemによる皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン8mg/日
 予防投与を行う

以下のいずれかに該当する、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者
 ・化学療法歴のないEGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性
 ・EGFR遺伝子変異(エクソン20挿入変異を除く)陽性
 (EGFRチロシンキナーゼ阻害剤による治療後に増悪した患者)