

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

リブプロファズ皮下注+CBDCA/Pem (C2-4 BW $\geq$ 80kg)
 (登録No. 26LU11)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 コース目・変更)

	予定日付	／
P e m	(500mg/m ²)	↓
C B D C A	(5×(G+25))	↓
Amivantamab	(3360mg)	↓
	Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

Exson20挿入変異陽性・EGFR遺伝子変異陽性

★要時発注：リブプロファズ

1	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100 mL ペトリセト点滴静注液「NK」 () mg (500mg/m ²)	100 mL () mg	点滴注射 10分	(1)
3	ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン注射液 () mg (5×(G+25))	250 mL () mg	点滴注射 60分	(1)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5	リブプロファズ配合皮下注 (3360) mg		皮下注射 腹部に5分かけて投与 腹部の異なる場所に連続して投与 30mLのシリンジに均等に分割	(1)
6	アプレピタントカプセル125mg「N」	1 c p	内服 点滴開始時 day1	
7	アプレピタントカプセル80mg「NK」	1 c p	内服 朝食後 day2、3	
8	ルパフィン錠10mg アセトアミノフェン錠500mg「マ」	1 錠 2 錠	内服 リブプロファズ投与30～60分前	

day1

パンピタン末	1g	内服 分1 朝食後	7日前より連日内服
メチコパール注射液 500 μ g	2A	筋肉内注射	7日前より9週毎投与

*Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日
予防投与を行う