

化学療法スケジュール表

- ☐ 一般治療
- ☐ 臨床試験
- ☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

リブロファズ皮下注+CBDCA/Pem (C5以降BW≥80kg
(登録No. 26LU13))

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 コース目・変更)

Pem	(500mg/m ²)	予定日付	↓
Amivantamab	(3360瓶)		↓
		Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)			

Exson20挿入変異陽性・EGFR遺伝子変異陽性 ★要時発注：リブロファズ

1 生理食塩液 100mL	100 mL	点滴注射	(1)
デキサート注射液6.6mg	1 瓶	15分	
2 生理食塩液 100mL	100 mL	点滴注射	(1)
ペメトレキド点滴静注液「NK」 () mg (500mg/m ²)	() mg (500mg/m ²)	10分	
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 リブロファズ配合皮下注 (3360) mg		皮下注射 腹部に5分かけて投与 腹部の異なる場所に連続して投与 30mLのシリンジに均等に分割	(1)
5 ルパフィン錠10mg	1 錠	内服	
アセトアミノフェン錠500mg「マ	2 錠	リブロファズ投与30～60分前 day1	
バンピタン末	1g	内服 分1 朝食後 7日前より連日内服	
メチコパール注射液500μg	2A	筋肉内注射 7日前より9週毎投与	
*Pemによる皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン8mg/日 予防投与を行う			