

化学療法スケジュール表

- ☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

VIP
(登録No. 26UR02)

病名	推奨度
精巣腫瘍	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

		予定日付				
		↓	↓	↓	↓	↓
IFM	(1.2 g/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓
VP-16	(75 mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓
CDDP	(20 mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓
Day		1	2	3	4	5
		(1サイクル 21 日) (休薬 16 日以上)				

4コース

1 ソルデム3A輸液 500 mL	500 mL	点滴注射	
メイロン静注8.4% 20 mL	2 A	480分	
		メイン①	(1) (2) (3) (4) (5)
2 ソルデム3A輸液 500 mL	500 mL	点滴注射	
メイロン静注8.4% 20 mL	2 A	480分	
		メイン②	(1) (2) (3) (4) (5)
3 ソルデム3A輸液 500 mL	500 mL	点滴注射	
メイロン静注8.4% 20 mL	2 A	480分	
		メイン③	(1) (2) (3) (4) (5)
4 パロ/ヒトロン点滴静注パッグ0.75mg/50	50 mL	点滴注射	
デキサート注射液6.6 mg	1 瓶	15分	
デキサート注射液1.65 mg	2 A	側管	(1)
5 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液6.6 mg	1 瓶	15分	
デキサート注射液1.65 mg	1 A	側管	(2) (3) (4) (5)
6 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射	
イホマイド注射用1 g () g (1.2 g/m ²)		120分	
		ウロミテキサンと同時に	
		側管	(1) (2) (3) (4) (5)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
ウロミテキサン注400 mg	400 mg	30分	

			イホマイドと同時に 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
8	生理食塩液テルモ 500 mL ベプシド注 100 mg () mg (75mg/m ²)	500 mL	点滴注射 120分 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
9	生理食塩液 50 mL ウロミテキサン注 400 mg	50 mL 400 mg	点滴注射 30分 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
10	生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 () mg (20mg/m ²)	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
11	マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
12	生理食塩液 50 mL ウロミテキサン注 400 mg	50 mL 400 mg	点滴注射 30分 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
13	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 イホマイド投与1時間前	
14	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 朝食後 day2-5	