

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**FOLFIRI (インフューザー使用)**  
(登録No. 06GI12)

病名	推奨度
大腸癌	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	／
1-LV (200mg/m <sup>2</sup> )		↓
CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (2400mg/m <sup>2</sup> )		↓
	Day 1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

1 パロセチン点滴静注パック 0.75mg/50 - デキサート注射液 6.6 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 ( ) mg (200mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 120分 イリノカンと同時滴下 側管	(1)
3 ブドウ糖液 5% (250 mL) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 ( ) mg (150mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 90分 レボホリナートと同時滴下	(1)
4 フルオロウラシル注 ( ) mg (400mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, CPT-11同時滴下終了後	(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6 フルオロウラシル注 ( ) mg (2400mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 50 mL	50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)