

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

R-CHOP (外来用)
(登録No. 06HT01)

病名	推奨度
非ホジキンリンパ腫	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/
Rit-BS (375mg/m ²)	↓						
DXR (50mg/m ²)		↓					
VCR (1.4mg/m ²)			↓				
CPA (750mg/m ²)				↓			
PSL (100mg)					↓		
	Day	1	2	3	4	5	6
		(1サイクル 21 日)			(休薬 15 日以上)		

CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 6~8コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	(1)
ポララミン注 5 mg	1 A	全開	
2 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射	(1)
リツキシマブBS点滴静注 () mg (375mg/m ²)		180分	
		初回 ~60分 25ml/hr	
		60~120分 100ml/hr	
		120分~ 200ml/hr	
		2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr	
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 ソルデム 3 A 輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 180分 MAIN	(2)
5 グラセプトン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1 袋	点滴注射 全開 側管	(2)
6 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
トキソルビシン塩酸塩注射液50mg 「サト」 () mg (50mg/m ²)		30分 側管	

			Total 100mLに調製	(2)
7 生理食塩液 100mL オンコビン注射用1mg	(100) mg (1.4mg/ml)	100 mL	点滴注射 30分 VCR max2mg 側管	(2)
8 大塚生食注 (250mL袋) エンドキサン注射用	(250) mg (750mg/ml)	250 mL	点滴注射 120分 側管	(2)
9 生理食塩液 50mL	50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(2)
10 アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠		内服 リツキマブ 投与30分前	
11 プレドニン錠 5mg	(100) mg		内服 朝12錠 昼8錠 食後	