

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

BEP
(登録No. 07C001)

病名	推奨度
胚細胞腫瘍	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/
VP-16 (100mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓			
BLM (30mg)		↓					↓	↓
CDDP (20mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓			
	Day	1	2	3	4	5	9	16
		(1サイクル 21日)			(休薬 5日以上)			

原則day 1～5は入院、day9、16は外来で施行

1	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100mL デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg	100 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(2) (3) (4) (5)
3	生理食塩液テルモ 500mL ペプシド注 100mg () mg (100mg/m ²)	500 mL () mg (100mg/m ²)	点滴注射 90分	(1) (2) (3) (4) (5)
4	生理食塩液テルモ 500mL	500 mL	点滴注射 90分	(1) (2) (3) (4) (5)
5	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 全開 ルートキープ	(9) (16)
6	生理食塩液 100mL ブレオ注射用 15mg () mg	100 mL 30) mg	点滴注射 30分	(2) (9) (16)
7	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(9) (16)
8	生理食塩液テルモ 500mL	500 mL	点滴注射 90分	(1) (2) (3) (4) (5)
9	生理食塩液テルモ 500mL	500 mL	点滴注射	

シスプラチン点滴静注	() m g (20m g / m ²)	90分 CDDPの輸液量はTOTAL 500mLと なるように生食を抜いて調製	(1) (2) (3) (4) (5)
10 マンニトールS注射液 (300mL)	300 m L	点滴注射 60分	(1) (2) (3) (4) (5)
11 生理食塩液テルモ 500 mL	500 m L	点滴注射 90分	(1) (2) (3) (4) (5)
12 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 シスプラチン投与1時間前 day1	
13 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 朝食後 day2-5	