

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

|      |                |     |   |
|------|----------------|-----|---|
| 身長   | cm             | 診療科 |   |
| 体重   | kg             |     |   |
| 体表面積 | m <sup>2</sup> |     |   |
| Scr  | mg/dL          | 医師  | 印 |
| Ccr  | ml/min         |     |   |

**Bmab+mFOLFOX6 (インフューザー使用)**  
(登録No. 07GI03)

| 病名  | 推奨度 |
|-----|-----|
| 大腸癌 | A   |

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

|                          |                           |   |
|--------------------------|---------------------------|---|
|                          | 予定日付                      | ↓ |
| Bmab                     | (5m g/kg)                 | ↓ |
| 1-LV                     | (200m g/m <sup>2</sup> )  | ↓ |
| 1-OHP                    | (85m g/m <sup>2</sup> )   | ↓ |
| 5-FU                     | (400m g/m <sup>2</sup> )  | ↓ |
| 5-FU                     | (2400m g/m <sup>2</sup> ) | ↓ |
|                          | Day                       | 1 |
| (1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上) |                           |   |

|   |   |              |  |     |
|---|---|--------------|--|-----|
| 1 | パロセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 0.75mg/50<br>デキサート注射液 6.6mg          | 50 mL<br>1 瓶 | 点滴注射<br>15分  | (1) |
| 2 | 生理食塩液 100 mL<br>ペバシズマブBS点滴静注用 ( ) mg (5mg/kg)                   | 100 mL       | 点滴注射<br>90分<br>初回投与認容性良好なら<br>2回目投与は60分可<br>2回目投与認容性良好なら<br>以降の投与は30分可 | (1) |
| 3 | 大塚生食注 (250mL袋)<br>レボホリナート点滴静注用 ( ) mg (200mg/m <sup>2</sup> )   | 250 mL       | 点滴注射<br>120分<br>オキサリプラチンと同時滴下<br>側管                                    | (1) |
| 4 | ブドウ糖液5% (250 mL)<br>オキサリプラチン点滴静注液 ( ) mg (85mg/m <sup>2</sup> ) | 250 mL       | 点滴注射<br>120分<br>レボホリナートと同時滴下   | (1) |
| 5 | フルオロウラシル注 ( ) mg (400mg/m <sup>2</sup> )<br>生理食塩液 50 mL         | 50 mL        | 点滴注射<br>全開<br>1-LV, L-OHP同時滴下終了時                                       | (1) |
| 6 | 生理食塩液 50 mL   | 50 mL        | 点滴注射<br>フラッシュ用   | (1) |
| 7 | フルオロウラシル注 ( ) mg (2400mg/m <sup>2</sup> )                       |              | 中心静脈注射・精密持続  |     |

生理食塩液 50 mL

50 mL

インフューザー使用 4 6時間  
生食希釈量早見表参照

(1)