

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**FP-RT (70-700)**  
(登録No. 08GI01)

病名	推奨度
食道癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

5-FU (700mg/m <sup>2</sup> )	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
CDDP (70mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Day	1	2	3	4	5	29	30	31	32	
		(1サイクル 42日)					(休薬 9日以上)				

**RT : 2Gy/day × 30回 day2以降十分な輸液を行うこと**

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	フルオウラシルルートプライミング用	(1) (29)
2 生理食塩液テルモ 500 mL フルオウラシル注 ( ) mg (700mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射	MAIN 24時間	(1) (2) (3) (4) (29) (30) (31) (32)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	フルオウラシルフラッシュ用	(4) (32)
4 生理食塩液テルモ 500 mL ホスア <sup>レ</sup> ビ <sup>タ</sup> ント点滴静注用150mg「NK	500 mL 1 瓶	点滴注射	90分 側管	(1) (29)
5 パロセトン点滴静注 <sup>ハ</sup> ック <sup>0</sup> 0.75mg/50 デキサート注射液6. 6 mg デキサート注射液1. 6 5 mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射	15分 側管	(1) (29)
6 生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸Mg 補正液1mEq/mL 20 mL	500 mL 8 mL	点滴注射	90分 側管	(1) (29)
7 マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射	60分 側管	(1) (29)
8 生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 ( ) mg (70mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射	120分 側管	

			CDDPの輸液量はtotal 500mlとなるように生食を抜いて調製	
9	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1) (29)
10	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1) (29)
11	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1) (29)
12	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2) (30)
13	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6 mg	100 mL 2 瓶	点滴注射 15分	(3) (31)
14	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (30) (31) (32) (33)
15	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (30) (31) (32) (33)
16	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (30) (31) (32) (33)
17	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (30) (31) (32) (33)