

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**ABVD**  
(登録No. 08HT11)

病名	推奨度
ホジキンリンパ腫	A

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	／	／
DXR (25mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓
BLM (10mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓
VLB (6mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓
DTIC (375mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓
Day	1	15	
(1サイクル 28 日) (休薬 13 日以上)			

**4~8コース BLM: 総投与量180mg/body以下**

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 MAIN 3時間	(1) (15)
2 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(1) (15)
3 生理食塩液 100mL ドキシルビシン塩酸塩注射液50mg「サト( ) mg (25mg/m <sup>2</sup> )	100 mL	点滴注射 30分 側管	(1) (15)
4 生理食塩液 100mL ブレオ注射用15mg ( ) mg (10mg/m <sup>2</sup> )	100 mL	点滴注射 60分 側管	(1) (15)
5 生理食塩液 100mL エクザール注射用10mg ( ) mg (6mg/m <sup>2</sup> )	100 mL	点滴注射 30分 側管	(1) (15)
6 生理食塩液 100mL ダカルバジン注用100 ( ) mg (375mg/m <sup>2</sup> )	100 mL	点滴注射 30分 側管 ルートも遮光	(1) (15)
7 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	

- |                       |       |                          |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| 8 アプレピタントカプセル125mg 「N | 1 c p | 内服<br>day1. 15 点滴開始時     |
| 9 アプレピタントカプセル80mg 「NK | 1 c p | 内服<br>day2. 3 16. 17 朝食後 |