

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

**CBDCA/Pem**  
(登録No. 09LU03)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	C

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/
Pem	(500mg/m <sup>2</sup> )	↓		
CBDCA	(6×(G+25))	↓		
	Day	1	2	3
(1サイクル 21 日) (休薬 18 日以上)				

**扁平上皮癌を除く 最大6コース**

1	パロセチン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100 mL ペムセト点滴静注液「NK」 ( ) mg (500mg/m <sup>2</sup> )	100 mL	点滴注射 10分	(1)
3	ブドウ糖液 5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液 ( ) mg (6×(G+25))	250 mL	点滴注射 60分	(1)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5	アプレピタントカプセル125mg「N」	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
6	アプレピタントカプセル80mg「NK」	1 c p	内服 day2, 3 朝食後	
	パンビタン末	1g	内服 分1 朝食後 7日前より連日内服	
	メチコバル注射液 500 μg	2A	筋肉内注射 7日前より9週毎投与	
*Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日 予防投与を行う				