

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

PTX/CBDCA+Bmab
(登録No. 09LU04)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	A

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/
PTX	(200mg/m ²)	↓		
CBDCA	(6×(G+25))	↓		
Bmab	(15mg/kg)	↓		
	Day	1	2	3
(1サイクル 21 日) (休薬 18 日以上)				

最大6コース 扁平上皮癌を除く

1	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6. 6 mg デキサート注射液1. 6 5 mg ファモチゾン注射液20mg 「トーワ」 ポララミン注5 mg	100 mL 2 瓶 2 A 1 A 1 A	点滴注射 15分	(1)
2	パロセトロン点滴静注バッグ [®] 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 30分	(1)
3	ブドウ糖液5% (500 mL) パクリタキセル注 () mg (200mg/m ²)	500 mL	点滴注射 180分	(1)
4	ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (6×(G+25))	250 mL	点滴注射 60分	(1)
5	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6	生理食塩液 100 mL ベバシズマブBS点滴静注用 () mg (15mg/kg)	100 mL	点滴注射 90分 初回投与忍容性良好なら 2回目投与は60分可 2回目投与忍容性良好なら 以降の投与は30分可	(1)
7	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	

- | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|
| 8 アプレピタントカプセル125mg 「N | 1 c p | 内服
day1 点滴開始時 |
| 9 アプレピタントカプセル80mg 「NK | 1 c p | 内服
day2, 3 朝食後 |