

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**Pmab+mFOLFOX6 (インフューザ-使用)**  
(登録No. 10GI03)

病名	推奨度
大腸癌	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	／
Pmab (6m g/kg)	↓	
1-LV (200m g/m <sup>2</sup> )	↓	
1-OHP (85m g/m <sup>2</sup> )	↓	
5-FU (400m g/m <sup>2</sup> )	↓	
5-FU (2400m g/m <sup>2</sup> )	↓	
Day	1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

**RAS野生型に使用**

1 生理食塩液 50 mL デキサート注射液 6. 6 m g	50 mL 1 瓶	点滴注射 全開 ルート確保用	(1)
2 生理食塩液 100 mL ベクティビックス点滴静注 100 ( ) m g (6m g/kg)	100 mL	点滴注射 60分 2回目以降の投与は15分可	(1)
3 パロセトン点滴静注バッグ 0. 75mg/50	50 mL	点滴注射 15分	(1)
4 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 ( ) m g (200m g/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 120分 タキブラチンと同時滴下 側管	(1)
5 ブドウ糖液 5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 ( ) m g (85m g/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 120分 レボホリナートと同時滴下	(1)
6 生理食塩液 50 mL フルオロウラシル注 ( ) m g (400m g/m <sup>2</sup> )	50 mL	点滴注射 1-LV, L-OHP同時滴下終了後 全開	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

フラッシュ用

8 フルオロウラシル注  
生理食塩液 50 mL

( ) mg (2400mg/m<sup>2</sup>)  
50 mL

中心静脈注射・精密持続  
インフューザー使用 46時間  
生食希釈量早見表参照

(1)

(1)