

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**High-dose MTX/AraC**  
(登録No. 10HT02)

病名	推奨度
急性リンパ性白血病	A
悪性リンパ腫	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/
MTX (200mg/m <sup>2</sup> )	↓				
MTX (800mg/m <sup>2</sup> )	↓				
AraC (3000mg/m <sup>2</sup> )			↓	↓	
AraC (3000mg/m <sup>2</sup> )			↓	↓	
Day	1	2	3	4	
	(1サイクル 21 日)		(休薬 17 日以上)		

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射	10:00~翌10:00	(1)(2)(3)(4)
2 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開	10:00	(1)
3 生理食塩液 100mL ソル・メドロール静注用40mg	100 mL 40 mg	点滴注射	60分 10:00~11:00	(1)(2)(3)
4 生理食塩液 100mL ソル・メドロール静注用40mg	100 mL 40 mg	点滴注射	60分 22:00~23:00	(1)(2)(3)
5 ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射	180分 補液追加あり	(1)(2)(3)(4)
6 ブドウ糖液5% (500mL) メソトレキセート注射用 ( ) mg (200mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射	120分 急速静注MTX 11:00~13:00 total 500mLとなるように調製	(1)
7 ブドウ糖液5% (500mL) メソトレキセート注射用 ( ) mg (800mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射	持続点滴MTX 21時間 13:00~翌10:00	

			total 500mLとなるように調製	(1)
8	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 翌10時 MTXフラッシュ用	(1)
9	生理食塩液テルモ 500 mL キロサイド注 ( ) mg (3000mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 180分 11:00~14:00 total 500mLとなるように調製	(2)(3)
10	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(2)(3)
11	生理食塩液テルモ 500 mL キロサイド注 ( ) mg (3000mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 180分 23:00~翌2:00 total 500mLとなるように調製	(2)(3)
12	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(2)(3)
13	生理食塩液 50 mL アイソボリン点滴静注用25mg	50 mL 7.5 mg	点滴注射 全開 MTX終了24hr後(day3 10:00)より 6時間毎(4° 10° 16° 22°)に投与 MTXの血中濃度が0.1μM以下に なるまで投与継続する	(3)(4)