

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

|      |                |     |   |
|------|----------------|-----|---|
| 身長   | cm             | 診療科 |   |
| 体重   | kg             |     |   |
| 体表面積 | m <sup>2</sup> |     |   |
| Scr  | mg/dL          | 医師  | 印 |
| Ccr  | ml/min         |     |   |

**CDDP/VP-16**  
(登録No. 10LU02)

| 病名    | 推奨度 |
|-------|-----|
| 小細胞肺癌 | A   |

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

|                               |      |              |   |   |             |   |   |   |
|-------------------------------|------|--------------|---|---|-------------|---|---|---|
|                               | 予定日付 | /            | / | / | /           | / | / | / |
| VP-16 (100mg/m <sup>2</sup> ) | ↓    |              |   |   |             |   |   |   |
| CDDP (80mg/m <sup>2</sup> )   | ↓    |              |   |   |             |   |   |   |
| VP-16 (100mg/m <sup>2</sup> ) |      | ↓            | ↓ |   |             |   |   |   |
|                               | Day  | 1            | 2 | 3 | 4           | 5 | 6 | 7 |
|                               |      | (1サイクル 21 日) |   |   | (休薬 14 日以上) |   |   |   |

**3～6コース day2以降十分な輸液必要**

|                                                                |                     |                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 1 生理食塩液テルモ 500 mL<br>ホスプレト点静注用150mg 「NK                        | 500 mL<br>1 瓶       | 点滴注射<br>90分                                        | (1) |
| 2 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50<br>デキサート注射液6.6mg<br>デキサート注射液1.65mg     | 50 mL<br>1 瓶<br>2 A | 点滴注射<br>15分                                        | (1) |
| 3 生理食塩液テルモ 500 mL<br>ペプシド注100mg ( ) mg (100mg/m <sup>2</sup> ) | 500 mL              | 点滴注射<br>90分                                        | (1) |
| 4 生理食塩液テルモ 500 mL<br>硫酸M補正液1mEq/mL 20mL                        | 500 mL<br>8 mL      | 点滴注射<br>90分                                        | (1) |
| 5 マンニトールS注射液 (300mL)                                           | 300 mL              | 点滴注射<br>60分                                        | (1) |
| 6 生理食塩液テルモ 500 mL<br>シスプラチン点滴静注 ( ) mg (80mg/m <sup>2</sup> )  | 500 mL              | 点滴注射<br>120分<br>CDDPの輸液量はtotal 500mlとなるように生食を抜いて調製 | (1) |
| 7 生理食塩液テルモ 500 mL                                              | 500 mL              | 点滴注射<br>90分                                        | (1) |
| 8 生理食塩液テルモ 500 mL                                              | 500 mL              | 点滴注射<br>90分                                        | (1) |

|    |                                |                                          |              |                         |
|----|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 9  | 生理食塩液テルモ 500 mL                | 500 mL                                   | 点滴注射<br>90分  | (1)                     |
| 10 | 生理食塩液 100 mL<br>デキサート注射液6.6 mg | 100 mL<br>1 瓶                            | 点滴注射<br>15分  | (2)                     |
| 11 | 生理食塩液 100 mL<br>デキサート注射液6.6 mg | 100 mL<br>2 瓶                            | 点滴注射<br>15分  | (3)                     |
| 12 | 生理食塩液テルモ 500 mL<br>ペプシド注100 mg | 500 mL<br>( ) mg (100mg/m <sup>2</sup> ) | 点滴注射<br>90分  | (2) (3)                 |
| 13 | 生理食塩液テルモ 500 mL                | 500 mL                                   | 点滴注射<br>120分 | (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
| 14 | 生理食塩液テルモ 500 mL                | 500 mL                                   | 点滴注射<br>120分 | (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
| 15 | 生理食塩液テルモ 500 mL                | 500 mL                                   | 点滴注射<br>120分 | (2) (3) (4) (5)         |
| 16 | 生理食塩液テルモ 500 mL                | 500 mL                                   | 点滴注射<br>120分 | (2) (3) (4) (5)         |