

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

CBDCA/ Pem + Bmab
(登録No. 10LU03)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	A

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

Pem	(500mg / m ²)	↓
CBDCA	(6 × (G+25))	↓
Bmab	(15mg / kg)	↓
	Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

扁平上皮癌を除く 最大6コース

1	パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100mL ペトレキト点滴静注液「NK」 () mg (500mg / m ²)	100 mL	点滴注射 10分	(1)
3	ブドウ糖液 5% (250mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (6 × (G+25))	250 mL	点滴注射 60分	(1)
4	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5	生理食塩液 100mL ベバシズマブBS点滴静注用 () mg (15mg / kg)	100 mL	点滴注射 90分 初回投与忍容性良好なら 2回目投与60分可 2回目投与忍容性良好なら 以降の投与は30分可	(1)
6	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7	アプレピタントカプセル125mg 「N」	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
8	アプレピタントカプセル80mg 「NK」	1 c p	内服	

day2,3 朝食後

パンビタン末 1g 内服 分1 朝食後 7日前より連日内服
メチコバル注射液500 μ g 2A 筋肉内注射 7日前より9週毎投与

*Pemによる皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン8mg/日
予防投与を行う