

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**Pem + Bmab維持**  
(登録No. 10LU04)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

Pem	(500mg / m <sup>2</sup> )	予定日付	↓
Bmab	(15mg / kg)		↓
		Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)			

**扁平上皮癌を除く**

1 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液 6.6 mg	1 瓶	15分	(1)
2 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
ペムトレキセト点滴静注液「NK」 ( ) mg (500mg / m <sup>2</sup> )		10分	(1)
3 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
ベバシズマブBS点滴静注用 ( ) mg (15mg / kg)		30分	
		初回投与忍容性良好なら	
		2回目投与60分可	
		2回目投与忍容性良好なら	
		以降の投与は30分可	(1)
4 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	(1)
パンピタン末	1g	内服 分1 朝食後	7日前より連日内服
メチコバル注射液 500 μg	2A	筋肉内注射	7日前より9週毎投与
*Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日 予防投与を行う			