

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

**I FM/CDDP**  
(登録No. 11GY04)

病名	推奨度
子宮癌肉腫	B

施用開始日 年 月 日  
(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/
I FM (1.5 g/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓
CDDP (20mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4
		(1サイクル 21 日)		(休薬 17 日以上)	

**3~6コース**

1	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 2 A	点滴注射 MAIN 3時間	(1) (2) (3) (4)
2	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 2 A	点滴注射 MAIN 3時間	(1) (2) (3) (4)
3	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 2 A	点滴注射 MAIN 3時間	(1) (2) (3) (4)
4	パロセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(1)
5	生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	100 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(2) (3) (4)
6	生理食塩液テルモ 500mL イホマイド注射用1g ( ) g (1.5g/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 120分 Rp. 7のウロミテキサンと同時に開始 側管	(1) (2) (3) (4)
7	生理食塩液 50mL ウロミテキサン注400mg	50 mL 800 mg	点滴注射 30分 Rp. 6のイホマイドと同時に開始 側管	(1) (2) (3) (4)
8	生理食塩液テルモ 500mL	500 mL	点滴注射	

シスプラチン点滴静注	( ) m g (20m g/m <sup>2</sup> )	120分 側管	(1) (2) (3) (4)
9 生理食塩液 50 mL ウロミテキサン注400 m g	50 mL 800 m g	点滴注射 30分 側管	(1) (2) (3) (4)
10 マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分 側管	(1) (2) (3) (4)
11 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分 側管	(1) (2) (3) (4)
12 生理食塩液 50 mL ウロミテキサン注400 m g	50 mL 800 m g	点滴注射 30分 側管	(1) (2) (3) (4)
13 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 IFM投与1時間前 day1	
14 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 朝食後 day2-4	