

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**EMA-CO**  
(登録No. 11GY10)

病名	推奨度
絨毛癌	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
VP-16 (100mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓				
ACT-D (0.5mg)	↓	↓				
MTX (300mg/m <sup>2</sup> )	↓					
VCR (1mg/m <sup>2</sup> )					↓	
CPA (600mg/m <sup>2</sup> )					↓	
Day	1	2	3	4	8	

(1サイクル 14 日) (休薬 6 日以上)

**hCG値がカット以下になってから3-5コース追加し、3ヶ月間カット値が維持した場合**

1	パロチロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1) (8)
2	生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2)
3	生理食塩液テルモ 500 mL ペプシド注 100mg ( ) mg (100mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 90分	(1) (2)
4	生理食塩液 50 mL コスメゲン静注用 0.5mg ( 0.5) mg 注射用水 20 mL 1.1 mL	50 mL	点滴注射 全開で 1Vあたり1.1mLの注射用水で溶解 1mL中にACT-D 0.5mg含有	(1) (2)
5	ブドウ糖液 5% (500 mL) メソトレキセート注射用 ( ) mg (300mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 12時間	(1)
6	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ	(1) (2)
7	生理食塩液 50 mL オンコピン注射用 1mg ( ) mg (1mg/m <sup>2</sup> )	50 mL	点滴注射 15分 VCR : MAX 2mg	(8)
8	生理食塩液テルモ 250 mL	250 mL	点滴注射	

エンドキサン注射用	( ) m g (600m g/m <sup>2</sup> )	60分	(8)
9 生理食塩液 50 m L	50 m L	点滴注射 フラッシュ	(8)
10 ロイコボリン錠 5 m g	6 錠	内服 分2 12時間ごと day2の21時から開始 12時間毎に4回	