

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**EMA/EP**  
(登録No. 11GY11)

病名	推奨度
絨毛癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VP-16	(150mg/m <sup>2</sup> )	↓									
CDDP	(75mg/m <sup>2</sup> )	↓									
VP-16	(100mg/m <sup>2</sup> )								↓		
ACT-D	(0.5mg)								↓		
MTX	(300mg/m <sup>2</sup> )								↓		
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/									
	Day	11									
(1サイクル 14 日) (休薬 3 日以上)											

**hCG値がカット以下になってから3-5コース追加、3ヶ月カット値が維持した場合**

1 生理食塩液テルモ 500mL ホスアプレタ点滴静注用150mg「NK	500 mL 1 瓶	点滴注射 90分	(1)
2 パロセロン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
3 生理食塩液テルモ 500mL ペプシド注100mg ( ) mg (150mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 90分	(1)
4 生理食塩液テルモ 500mL 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	500 mL 8 mL	点滴注射 90分	(1)
5 マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分	(1)
6 生理食塩液テルモ 500mL シスプラチン点滴静注 ( ) mg (75mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 12時間 CDDPの輸液量はtotal 500mlとなるように生食を抜いて調製	(1)
7 生理食塩液テルモ 500mL	500 mL	点滴注射 90分	

			CDDPと同時に側管より 側管①	(1)
8	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管②	(1)
9	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管③	(1)
10	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2)
11	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6 mg	100 mL 2 瓶	点滴注射 15分	(3)
12	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5)
13	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5)
14	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5)
15	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5)
16	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(6) (7)
17	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(6) (7)
18	生理食塩液 100 mL アロキシ静注0.75mg デキサート注射液6.6 mg	100 mL 1 瓶 1 瓶	点滴注射 15分	(8)
19	生理食塩液テルモ 500 mL ベプシド注100 mg	500 mL ( ) mg (100mg/mL)	点滴注射 90分	(8)
20	生理食塩液 50 mL コスメゲン静注用0.5 mg 注射用水 20 mL	50 mL 0.5 mg 1.1 mL	点滴注射 全開で 1Vあたり1.1mLの注射用水で溶解 1mL中にACT-D 0.5mg含有	(8)
21	ブドウ糖液5% (500 mL) メソトレキセート注射用	500 mL ( ) mg (300mg/mL)	点滴注射 12時間	(8)
22	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

23 ロイコボリン錠 5 m g

6 錠

内服

分2 12時間ごと

day9の21時から開始

12時間毎に4回