

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

AML地固め③(ACR-AraC)
(登録No. 11HT08)

病名	推奨度
急性骨髄性白血病	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
ACR (20mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	↓
AraC (200mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5
		(1サイクル 28 日)		(休薬 23 日以上)		

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 茶 ルートキープ 10:00~翌10:00	(1) (2) (3) (4) (5)
2 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開 10:00	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 アクラシノン [®] ライシグ [®] 用 茶ルート側管	(2) (3) (4) (5)
4 生理食塩液 100mL アクラシノン注射用 20mg () mg (20mg/m ²)	100 mL	点滴注射 茶ルート側管 10:00~10:30 アンスラサイクリン系薬剤使用例 では、ACRの累積総投与量が 600mg(力価)以上で重篤な心障害 のリスクが上昇するため注意	(1) (2) (3) (4) (5)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (2) (3) (4) (5)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 白 キロサイト [®] ルート [®] ライシグ [®] 用	(1)
7 生理食塩液テルモ 500mL キロサイド注 () mg (200mg/m ²)	500 mL	点滴注射 白ルート 10:00~翌10:00 total 500mLとなるように調製	

(1) (2) (3) (4) (5)

8 生理食塩液 50 mL

50 mL

点滴注射

白 キロサイト®フラッシュ用

(5)

9 ソルデム3A輸液 500 mL

500 mL

点滴注射

メイロン静注8.4% 20 mL

1 A

180分

補液追加あり

(1) (2) (3) (4) (5)