

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名  
患者 I D  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

tw Her (初回) + T C  
(登録No. 12BR47)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

病名	推奨度
乳癌	A

	予定日付	／
DOC (75m g / m <sup>2</sup> )		↓
CPA (600m g / m <sup>2</sup> )		↓
Trastuzumab (8m g / kg)		↓
	Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

1	パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6. 6 m g	50 m L 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液テルモ 2 5 0 m L トセキセル点滴静注液 ( ) m g (75m g / m <sup>2</sup> )	250 m L	点滴注射 60分	(1)
3	生理食塩液テルモ 2 5 0 m L エンドキサン注射用 ( ) m g (600m g / m <sup>2</sup> )	250 m L	点滴注射 30分	(1)
4	生理食塩液テルモ 2 5 0 m L トラスツズマブBS点滴静注用 ( ) m g (8m g / kg) 注射用水 2 0 m l 20 m L	250 m L	点滴注射 90分 2回目以降 4週間以上投与間隔が 空いている場合は 初回の投与量(8mg/kg)で60分での 投与可 60mg:注射用水3. 0m Lで溶解 150mg:注射用水7. 2mLで溶解	(1)
5	生理食塩液 5 0 m L	50 m L	点滴注射 フラッシュ用	(1)

12BR47

受付日 年 月 日