

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ADR/IFM
(登録No. 12C005)

病名	推奨度
軟部肉腫	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
DXR	(30mg/m ²)	↓	↓			
IFM	(2g/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5
		(1サイクル 21 日)			(休薬 16 日以上)	

非円形細胞肉腫 術前3コース、術後2コース

1	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 MAIN①	(1) (2) (3) (4) (5)
2	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 MAIN②	(1) (2) (3) (4) (5)
3	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 MAIN③	(1) (2) (3) (4) (5)
4	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 MAIN④	(1) (2) (3) (4) (5)
5	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 MAIN⑤	(1) (2) (3) (4) (5)
6	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 MAIN⑥	(1) (2) (3) (4) (5)
7	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(1)
8	生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	100 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(2)
9	生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	

			側管	(3) (4) (5)
10	生理食塩液 50 mL ダイアモックス注射用500 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 30分 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
11	生理食塩液テルモ 500 mL ドキルビリン塩酸塩注射液50mg 「サト」	500 mL) mg (30mg/ml)	点滴注射 120分 側管	(1) (2)
12	生理食塩液テルモ 500 mL イホマイド注射用1 g	500 mL) g (2g/ml)	点滴注射 240分 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
13	生理食塩液 50 mL ウロミテキサン注400 mg	50 mL 800 mg	点滴注射 30分 側管 イホマイドと同時滴下	(1) (2) (3) (4) (5)
14	生理食塩液 50 mL ウロミテキサン注400 mg	50 mL 800 mg	点滴注射 30分 側管 イホマイド投与4 hr後	(1) (2) (3) (4) (5)
15	生理食塩液 50 mL ウロミテキサン注400 mg	50 mL 800 mg	点滴注射 30分 側管 イホマイド投与8 hr後	(1) (2) (3) (4) (5)
16	生理食塩液 50 mL ダイアモックス注射用500 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 30分 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
17	アプレピタントカプセル125mg 「N」	1 c p	内服 点滴開始前に内服 day1	
18	アプレピタントカプセル80mg 「NK」	1 c p	内服 朝食後 day2-5	