

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

| | | | |
|-------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| S c r | mg/dL | 医 師 | 印 |
| C c r | ml/min | | |

JALSG Ph+ ALL202IMA 寛解導入
(登録No. 12HT02)

| 病 名 | 推奨度 |
|-----------|-----|
| 急性リンパ性白血病 | C |

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| DNR | (60m g / m ²) | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | |
| C P A | (1200m g / m ²) | ↓ | | | | | | | | | |
| V C R | (1.3m g / m ²) | ↓ | | | | | | ↓ | | | |
| P S L | (60m g / m ²) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| imatinib | (600m g) | | | | | | | ↓ | ↓ | ↓ | |
| | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| V C R | (1.3m g / m ²) | | | | | ↓ | | | | | |
| P S L | (60m g / m ²) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| imatinib | (600m g) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | Day | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| V C R | (1.3m g / m ²) | | ↓ | | | | | | | | |
| P S L | (60m g / m ²) | ↓ | | | | | | | | | |
| imatinib | (600m g) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | Day | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| imatinib | (600m g) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | Day | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| imatinib | (600m g) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | Day | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| imatinib | (600m g) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | Day | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | 予定日付 | / | / | / | | | | | | | |
| imatinib | (600m g) | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | |
| | Day | 61 | 62 | 63 | | | | | | | |

(1サイクル 63 日) (休薬 日以上)

day29 TITあり (MTX: 15mg/body, Ara-C: 40mg/body, DEX: 4mg/body)

| | | |
|------------------|--------|--------------------------------|
| 1 ソルデム3A輸液 500mL | 500 mL | 点滴注射 ルートキープ 10:00~翌10:00 |
|------------------|--------|--------------------------------|

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2 | パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 | 50 mL | 点滴注射 30分 側管 10:00~10:30 | (1) (2) (3) (8) (15) (22) |
| 3 | 生理食塩液 100 mL ダウノマイシン静注用 20 mg () mg (60mg/m ²) | 100 mL | 点滴注射 60分 側管 11:00~12:00 | (1) (2) (3) |
| 4 | 生理食塩液テルモ 500 mL エンドキサン注射用 () mg (1200mg/m ²) | 500 mL | 点滴注射 180分 側管 12:00~15:00 | (1) |
| 5 | 生理食塩液 20 mL オンコビン注射用 1 mg () mg (1.3mg/m ²) | 20 mL | 静脈内注射 側管 15:00 VCR: MAX 2 mg | (1) (8) (15) (22) |
| 6 | 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) (2) (3) |
| 7 | ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注 8.4% 20 mL | 500 mL 1 A | 点滴注射 180分 側管 | (1) (2) (3) (8) (15) (22) |
| 8 | ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注 8.4% 20 mL | 500 mL 1 A | 点滴注射 180分 側管 | (1) (2) (3) (8) (15) (22) |
| 9 | ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注 8.4% 20 mL | 500 mL 1 A | 点滴注射 180分 側管 | (1) (2) (3) (8) (15) (22) |
| 10 | プレドニン錠 5 mg () mg (60mg/m ²) | | 内服 day1-21 | |
| 11 | グリベック錠 100 mg (600) mg | | 内服 day8-63 | |