

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

## トリセノックス 寛解導入 (登録No. 12HT06)

病名	推奨度
急性前骨髄球性白血病	B

施用開始日 年 月 日  
(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

ATO	(0.15m g/kg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ATO	(0.15m g/kg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ATO	(0.15m g/kg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Day	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ATO	(0.15m g/kg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Day	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ATO	(0.15m g/kg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Day	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ATO	(0.15m g/kg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Day	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

(1サイクル 81 日) (休薬 21 日以上)

### 骨髄寛解が得られるまで 60日まで延長可能

1 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 15分 (1) (6) (11) (16) (21) (26) (31) (36) (41) (46) (51) (56)
2 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (32) (33) (34) (35) (37) (38) (39) (40) (42) (43) (44) (45) (47) (48) (49) (50) (52) (53) (54) (55) (57) (58) (59) (60)
3 ブドウ糖液 5% (250 mL) トリセノックス点滴静注12mg ( ) mg (0.15m g/kg)	250 mL	点滴注射 120分 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)
4 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

(33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)