

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**SMILE**  
(登録No. 12HT21)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
MTX	(2000mg/m <sup>2</sup> )	↓									
IFM	(1.5g/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓						
VP-16	(100mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓						
L-asparaginase	(6000単位/m <sup>2</sup> )					↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	8	10	12	14	16	18
L-asparaginase	(6000単位/m <sup>2</sup> )	↓									
	Day	20									

(1サイクル 28日) (休薬 8日以上)

**6コース**

1	ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)(2)(3)(4)
2	パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 15分	(1)
3	生理食塩液 100mL デキササート注射液 6.6mg	100 mL 6 瓶	点滴注射 30分	(2)(3)(4)
4	ブドウ糖液 5% (500mL) メソトレキセート注射用 ( ) mg (2000mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 360分 total 500mLとなるように調製	(1)
5	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6	生理食塩液 50mL アイソボリン点滴静注用 25mg	50 mL 7.5 mg	点滴注射 全開 MTX終了24hr後(day2 16:00)より 6時間毎(4° 10° 16° 22°)に投与 MTXの血中濃度が0.1μM以下に なるまで投与継続する	(2)(3)(4)

7	生理食塩液テルモ 500 mL イホマイド注射用 1 g	( ) g (1.5 g/mL)	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4)
8	生理食塩液 100 mL ウロミテキサン注 400 mg	( ) mg (300 mg/mL)	100 mL	点滴注射 30分 体マイトと同時滴下	(2) (3) (4)
9	生理食塩液 100 mL ウロミテキサン注 400 mg	( ) mg (300 mg/mL)	100 mL	点滴注射 30分 体マイト投与4時間後	(2) (3) (4)
10	生理食塩液 100 mL ウロミテキサン注 400 mg	( ) mg (300 mg/mL)	100 mL	点滴注射 30分 体マイト投与8時間後	(2) (3) (4)
11	生理食塩液テルモ 500 mL ペプシド注 100 mg	( ) mg (100 mg/mL)	500 mL	点滴注射 120分 0.4mg/mL以下の濃度となるように 調製	(2) (3) (4)
12	ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注 8.4% 20 mL		500 mL 1 A	点滴注射 180分 補液追加あり	(1) (2) (3) (4)
13	生理食塩液 50 mL		50 mL	点滴注射 ルートキープ	(8) (10) (12) (14) (16) (18) (20)
14	生理食塩液 100 mL ロイナーゼ注用 5000 注射用水 20 mL	( ) 単位 (6000単位/mL)	100 mL 20 mL	点滴注射 30分 L-asplVに対し、注射用水5mLで 溶解し秤量	(8) (10) (12) (14) (16) (18) (20)
15	生理食塩液 50 mL		50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(8) (10) (12) (14) (16) (18) (20)