

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**R-MPV (1, 3, 5, 7コース)**  
(登録No. 13HT03)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	C

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Rit-B S (375mg/m <sup>2</sup> )	↓									
MTX (3500mg/m <sup>2</sup> )		↓								
VCR (1.4mg/m <sup>2</sup> )			↓							
PCZ (100mg/m <sup>2</sup> )				↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

(1サイクル 14 日) (休薬 5 日以上)

**5～7コース フロキサジンは奇数コースのみ内服**

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10:00～ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)	
2 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 側管 10:00～ 全開	(1)
3 生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注 ( ) mg (375mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 10:00～ 初回～60分 25mL/hr 60～120分 100mL/hr 120分以降 200mL/hr 2コース目からは始め1時間 100mL/hr 以降200mL/hrも可	(1)
4 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5 パロセトロン点滴静注ハック® 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開 側管 10:00～	(2)
6 生理食塩液 100mL ソル・メドロール静注用40mg	100 mL 40 mg	点滴注射 60分 10:00～11:00	(2)
7 ブドウ糖液5% (500mL)	500 mL	点滴注射	

メソトレキセート注射用	( ) m g (3500m g/m <sup>2</sup> )	120分 Total 500mLとなるように調製 側管 11:00~13:00	(2)
8 生理食塩液 100 mL オンコビン注射用1 mg	100 mL ( ) m g (1.4m g/m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 13:00~13:30 max 2mg	(2)
9 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(2)
10 生理食塩液 100 mL ソル・メドロール静注用40mg	100 mL 40 m g	点滴注射 60分 側管 22:00~23:00	(2)
11 生理食塩液 50 mL アイソボリン点滴静注用25mg	50 mL 12 m g	点滴注射 全開 側管 MTX終了24hr後より 6時間毎	(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
12 アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 リツキマブ <sup>®</sup> 投与30分前	
13 塩酸プロカルバジンカプセル50mg	( ) m g (100m g/m <sup>2</sup> )	内服 奇数サイクル時内服 朝夕食後 day2-8	