

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面积	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

R-MPV (2, 4, 6コース)
(登録No. 13HT04)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	C

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Rit-BS	(375mg/m ²)	↓								
MTX	(3500mg/m ²)		↓							
VCR	(1.4mg/m ²)		↓							
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(1サイクル 14 日)		(休薬 5 日以上)						

5～7コース プロパジン[®]は奇数コースのみ内服

1	ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10:00～ (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
2	生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 側管 10:00～ 全開 (1)
3	生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注 () mg (375mg/m ²)	500 mL	点滴注射 10:00～ 初回～60分 25mL/hr 60～120分 100mL/hr 120分以降 200mL/hr 2コース目からは始め1時間 100mL/hr 以降200mL/hrも可 (1)
4	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 (1)
5	パロセトロン点滴静注パック [®] 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開 側管 10:00～ (2)
6	生理食塩液 100mL ソル・メドロール静注用40mg	100 mL 40 mg	点滴注射 60分 10:00～11:00 (2)
7	ブドウ糖液5% (500mL) メソトレキセート注射用 () mg (3500mg/m ²)	500 mL	点滴注射 120分

			Total 500mLとなるように調製 側管 11:00~13:00	(2)
8	生理食塩液 100 mL オンコビン注射用 1 mg	100 mL () mg (1.4 mg/m ²)	点滴注射 30分 13:00~13:30 max 2mg	(2)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(2)
10	生理食塩液 100 mL ソル・メドロール静注用40mg	100 mL 40 mg	点滴注射 60分 側管 22:00~23:00	(2)
11	生理食塩液 50 mL アイソボリン点滴静注用25mg	50 mL 12 mg	点滴注射 全開 側管 MTX終了24hr後より 6時間毎	(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
12	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 リツキマブ [®] 投与30分前	