

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

FOLFIRINOX (インフューザー-使用)
(登録No. 14GI02)

病名	推奨度
肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
1-OHP (85mg/m ²)		↓
1-LV (200mg/m ²)		↓
CPT-11 (180mg/m ²)		↓
5-FU (400mg/m ²)		↓
5-FU (2400mg/m ²)		↓
	Day 1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

1	パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50 アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg	50 mL 1 瓶 1 瓶 2 A	点滴注射 30分	(1)
2	ブドウ糖液 5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分	(1)
3	大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 側管	(1)
4	大塚生食注 (250mL袋) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 () mg (180mg/m ²)	250 mL	点滴注射 90分 レボホリナート投与開始30分後に 点滴開始	(1)
5	生理食塩液 50mL フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²)	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, CPT-11滴下終了後	(1)
6	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7	フルオロウラシル注 () mg (2400mg/m ²) 生理食塩液 50mL	50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	

8 デカドロン錠4mg

8 m g

内服
朝昼食後 day2-4