

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

FOLFOXIRI (インフューザー-使用)
(登録No. 14GI23)

病名	推奨度
大腸癌	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
CPT-11 (150mg/m ²)	↓	
I-LV (200mg/m ²)	↓	
I-OHP (85mg/m ²)	↓	
5-FU (2400mg/m ²)	↓	
	Day 1	
(1サイクル 14日) (休薬 13日以上)		

1 パロロチン点滴静注0.75mg/50 - アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 1 瓶 2 A	点滴注射 30分	(1)
2 大塚生食注 (250mL袋) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 () mg (150mg/m ²)	250 mL	点滴注射 90分	(1)
3 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 側管	(1)
4 ブドウ糖液5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 レボホリナート同時滴下	(1)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6 生理食塩液 50mL フルオロウラシル注 () mg (2400mg/m ²)	50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)
7 デカドロン錠4mg	8 mg	内服 朝昼食後 day2-4	