

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

Bmab+FOLFOXIRI (インテューザー使用)
(登録No. 14GI25)

病名	推奨度
大腸癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
Bmab (5mg/kg)		↓
CPT-11 (150mg/m ²)		↓
1-LV (200mg/m ²)		↓
1-OHP (85mg/m ²)		↓
5-FU (2400mg/m ²)		↓
	Day	1
(1サイクル 14日) (休薬 13日以上)		

1	パロセトロン点滴静注ハック® 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100mL ベバシズマブBS点滴静注用 () mg (5mg/kg)	100 mL () mg (5mg/kg)	点滴注射 90分 初回投与認容性良好なら 2回目投与は60分可 2回目投与認容性良好なら 以降の投与は30分可	(1)
3	大塚生食注 (250mL袋) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 () mg (150mg/m ²)	250 mL () mg (150mg/m ²)	点滴注射 90分	(1)
4	大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL () mg (200mg/m ²)	点滴注射 120分 側管	(1)
5	ブドウ糖液 5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)	250 mL () mg (85mg/m ²)	点滴注射 120分 レボホリナート同時滴下	(1)
6	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7	フルオロウラシル注 () mg (2400mg/m ²) 生理食塩液 50mL	() mg (2400mg/m ²) 50 mL	中心静脈注射・精密持続 インテューザー使用 46時間	

14GI25 <次ページ有>

受付日 年 月 日

8 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 点滴開始前 day1
9 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 朝食後 day2, 3
10 デカドロン錠4mg	8 m g	内服 朝昼食後 day2-4